

# Allergie sero-diagnostique

Mise en évidence d'anticorps IgE spécifiques d'allergènes chez le chien (test in vitro)

## SELECTION DES PATIENTS

Ce formulaire sert  
de base pour votre  
consultation d'allergie



### Symptômes principaux :

- Prurit** Répartition typique des démangeaisons :
- Tête *et/ou*  pattes  Axillae  Entres les coudes et les poignets
- Altérations cutanées entre :
- coudes et carpes *et/ou*  genoux et tarses

### Critères de Favrot

- Premiers symptômes avant l'âge de 3 ans  Le chien vit plutôt en appartement
- Les glucocorticoïdes font disparaître les symptômes  Au départ prurit sans altération cutanée
- Atteinte des membres antérieurs  Atteinte des conques auriculaires
- Bords d'oreilles NON touchés  Dos NON touché

5 critères sur 8: typique de la dermatite atopique et/ou de l'allergie alimentaire

## ANAMNÈSE

### Prurit : + / ++ / +++ (préciser)

- Saisonnier (DD : puces, autres ectoparasites)
- Toute l'année

Si saisonnier : Du mois de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

- Le prurit provoque-t-il des altérations cutanées ? (En cas d'allergie...)
- Le prurit est-il consécutif aux **altérations cutanées** ? (En cas d'ectoparasitose, de folliculite)

### LE PRURIT diminue par l'application de :

- |                  |                              |                              |   |  |
|------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Antibiotiques    | <input type="checkbox"/> oui | <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> complètement         | <input type="checkbox"/> partiellement       |
| Glucocorticoïdes | <input type="checkbox"/> oui | <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> complètement         | <input type="checkbox"/> partiellement       |
| Antiparasitaires | <input type="checkbox"/> oui | <input type="checkbox"/> non | <input type="checkbox"/> Esters phosphoriques | <input type="checkbox"/> Ivomec ou similaire |

Si **DIÈTE** : Laquelle ? \_\_\_\_\_

## CLINIQUE

- Prurit sans altérations cutanées sauf érythème
- Altérations cutanées suite aux démangeaisons (répartition typique, voir plus haut)
- Altérations cutanées en collerettes : couronne de pellicules, érythème central : souvent pyodermite
- Otite externe avec des altérations aux pattes/doigts : DD : Malassezies
- Papules avec poil au centre : DD : Folliculite ! (Staph., Dermatomyose, Demodex)
- Papules indépendantes des follicules pileux : DD : Ectoparasites, allergie (atopie, allergie alimentaire ou de contact)

## DIAGNOSTIQUE

- Raclages cutanés  Test avec scotch  Malassezia
- Culture de dermatophytes  Biopsies cutanées

## THÉRAPIE :

### Evaluation du succès de la thérapie

- |                                 |                                      |                                      |                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Thérapie avec antibiotiques     | <input type="checkbox"/> avec succès | <input type="checkbox"/> sans succès | <input type="checkbox"/> pas fait |
| Thérapie avec Itrakonazol       | <input type="checkbox"/> avec succès | <input type="checkbox"/> sans succès | <input type="checkbox"/> pas fait |
| Thérapie avec antiparasitaires  | <input type="checkbox"/> avec succès | <input type="checkbox"/> sans succès | <input type="checkbox"/> pas fait |
| Thérapie avec aglucocorticoïdes | <input type="checkbox"/> avec succès | <input type="checkbox"/> sans succès | <input type="checkbox"/> pas fait |

Si **Glucocorticoïde** : Dernière injection quand ? \_\_\_\_\_ Dernier comprimé quand ? \_\_\_\_\_

Si possible, diminuer les cortico 2 à 3 semaines avant la prise de sang.

**Pas indispensable, mais mieux, surtout après une thérapie à long terme**