

IDEXX LABOR

Wichtige Nachrichten für Tierhalter, schlechte Nachrichten für Parasiten

Helfen Sie Tierhalter/innen, die unschöne Wahrheit
über Darmparasiten und die Bedeutung von
Kotuntersuchungen zu verstehen.

IDEXX

KLARHEIT SCHAFFEN

+ + + + +

Jeder möchte gesündere Haustiere

Menschen sehen ihre Haustiere als Familienmitglieder. Sie möchten, dass sie so gesund wie möglich sind und sind bereit, alles zu tun, damit sie die beste medizinische Versorgung erhalten. Wenn Tierhalter/innen verstehen, wie regelmäßige Kotuntersuchungen dabei helfen, ihr Tier gesund zu erhalten, werden sie mit an Bord sein.

Diese Broschüre gibt Ihnen und Ihrem Team die Informationen, die sie brauchen, um bei Tierhalter/innen das Verständnis für Vorteile von Kotuntersuchungen bei gesunden Tieren zu verbessern.





Empfehlen Sie eine ganzjährige Parasitenkontrolle mit Breitspektrum-Präparaten

Es ist aber auch wichtig, dass ausgewachsene Hunde und Katzen parallel zur Entwurmung getestet werden, um deren Wirksamkeit zu demonstrieren und die korrekte Anwendung und Behandlungsfrequenz zu überprüfen. Ein routinemäßiges Screening auf Darmnematoden ist wichtig, um die Bedeutung der Mitarbeit von Tierhalter/innen zu betonen, das Wissen über in der Region vorkommenden Parasiten zu erweitern und als Frühwarnsystem für die Entwicklung von Resistenzen gegen Anthelminthika.¹

Parasiten sind überall. Aber warum wissen Tierhalter/innen das nicht?

Die meisten Tierhalter/innen denken nicht viel über Parasiten nach - wenn überhaupt. Sie wissen schlicht und einfach nicht, wie weit verbreitet Parasiten sind und dass sie die Gesundheit ihres Tieres und sogar von Menschen beeinträchtigen können.

Mit regelmäßigen Tests auf Darmparasiten können Sie sowohl die gute Durchführung der Entwurmung durch Tierhalter/innen betonen als auch Informationen über das Vorkommen von Parasiten in Ihrer Region erhalten.



Sehen Sie das Risiko für verschiedene Parasiten nach Land.

ESSCAP




[Die Studie lesen](#)

Parasiten sind überall

Die gesamteuropäische DOGSWALKS-Studie bestätigt die Notwendigkeit, auch gut gepflegte Hunde zu testen und zu behandeln.²

- + Ca. 2470 frische Kotproben von Hunden wurden gesammelt.
- + 164 Parks in 33 Städten in 12 europäischen Ländern wurden einbezogen.
- + Fecal Dx™ Antigentests, *Giardia*-Antigentests und Fäkalflotation mit Zentrifugation wurden durchgeführt



der Parks wurden positiv auf Darmparasiten getestet.



Zwischen 18 und 37 % der Parks wurden positiv auf Hakenwürmer (37,2 %), Spulwürmer (28,7 %) oder Peitschenwürmer (17,7 %) getestet.



1 von 4 Hunden wurde positiv auf Darmparasiten getestet.

Wappnen Sie Tierhalter/innen und Ihr Team für den Kampf gegen Parasiten

Informieren Sie Ihr Team und Tierhalter/innen über die Vorteile regelmäßiger Kotuntersuchungen. So profitieren alle - und ganz besonders die Tiere.

+ Teilen Sie medizinische Daten

Manche Tierhalter/innen haben vielleicht Fragen dazu, warum regelmäßige Tests nützlich oder hilfreich sind. Wenn Ihr gesamtes Team den wissenschaftlichen Aspekt und die Vorteile für die Tiergesundheit versteht, können Sie diese Dinge Tierhaltern/innen besser erklären. Dies gilt für grundsätzliche Informationen, aber auch bei Fragen nach Details.

+ Zeigen Sie Vorteile der Untersuchungen auf

Ein früher Nachweis bedeutet auch ein frühes Eingreifen und eine bessere medizinische Versorgung der Patienten. Die meisten Tierhalter/innen werden diesen Mehrwert verstehen und ein gutes Gefühl bei ihrer Entscheidung haben.

+ Stellen Sie den Kontext für die Praxis her

Ein Update der Vorsorgeprotokolle kann im Hinblick auf den Umsatz für die gesamte Praxis von Vorteil sein, ohne dabei Mehrarbeit für das Team zu verursachen. Wenn Ihr Team weiß, dass sowohl die Patienten als auch die Praxis profitieren, werden es alle unterstützen.





Erhalten Sie eine höhere Compliance mit den Empfehlungen von ESCCAP

Die Leitlinie 1 (GL1) des European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP) empfiehlt jetzt, dass bei allen Katzen und Hunden unabhängig von ihrem Entwurmungsstatus mindestens einmal jährlich eine routinemäßigen Kotuntersuchung durchgeführt werden sollte.¹ Gemäß der ESCCAP-Leitlinie 4 (GL4) kann ein Antigentest Infektionen nachweisen, die von anderen Methoden nicht erfasst werden (z. B. präpatente Infektionen), oder die Spezifität in Fällen von Koprophagie erhöhen.²

Anstelle von oder zusätzlich zu den üblichen Entwurmungsempfehlungen wird eine regelmäßige koprologische Untersuchung mindestens einmal im Jahr nahegelegt. Je nach Gesundheitszustand und Lebensumständen eines Hundes kann auch eine häufigere Testung indiziert sein. Informieren Sie Tierhalter/innen darüber, dass schon der Aufenthalt im Freien das Risiko einer Parasitenexposition birgt. Einige Parasiten können sich in die Haut oder Pfoten eines Hundes bohren. Hunde können ebenso beim Ablecken des Fells, Säugen oder der Aufnahme von kontaminierter Erde bzw. Kot Parasitenstadien oral aufnehmen. Tierhalter/innen sollten wissen, dass einige Parasiten auch von Haustieren auf Menschen übertragen werden können.³

Tipps zum Schutz der Tierhalter/innen und ihrer Haustiere

Geben Sie diese nützlichen Tipps weiter, um die Exposition gegenüber Parasiten zu minimieren:



Sammeln Sie den Kot Ihres Tieres auf und entsorgen Sie diesen.



Erinnern Sie Kinder daran, keine Erde oder schmutzige Hände in den Mund zu stecken.



Waschen Sie die Hände nach Kontakt mit Erde oder Sand.



Entwürmen Sie gemäß den Empfehlungen Ihrer Tierarztpraxis.



Decken Sie Sandkästen und Spielbereiche ab um zu verhindern, dass Wildtiere oder streunende Tiere diese verunreinigen.





Testen Sie Ihr Tier mindestens einmal im Jahr oder entsprechend den Empfehlungen Ihrer Tierarztpraxis.


Bleiben Sie in Kontakt

Persönliche Gespräche sind der beste Weg, um die Risiken durch Parasiten und die Vorteile regelmäßiger Kotuntersuchungen zu betonen. Aber Sie können Ihre Botschaft auch außerhalb der Praxis verbreiten.

- + Kostenlose [Broschüren](#) sind eine einfache Möglichkeit, damit Tierhalter/innen auch dann, wenn sie nicht in der Praxis sind, mehr erfahren können.
- + Eine der Funktionen von [VetConnect™ PLUS](#) ist die Möglichkeit, leicht verständliche und personalisierbare Zusammenfassungen der Befunde direkt aus der App zu versenden.
- + Soziale Medien sind eine sehr gute Möglichkeit, um ein größeres Publikum zu erreichen. In Posts können Sie beispielsweise über die Prävalenz von Parasiten in Ihrer Region informieren, auf das Infektionsrisiko hinweisen und Tipps zur Minimierung des Risikos geben. [Schauen Sie sich einige Beispiele für Posts an](#) und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie soziale Medien nutzen können.

*VetConnect Plus ist in der Schweiz für Labor-Befunde noch nicht verfügbar





Helfen Sie Haustieren und Familien auf eine neue Art

Der Fecal Dx™ Antigentest ist im Vergleich zur Flotation eine modernere Art der Diagnostik auf Darmparasiten. Er kann Parasiten nachweisen, bevor Eier bzw. Oozysten vorhanden sind und führt so zu einer erheblichen Verbesserung der Genauigkeit von Ergebnissen aus Kotuntersuchungen.⁴⁻⁶

Warum ist der Fecal Dx Antigentest anderen Methoden überlegen?

- + Der Fecal Dx Antigentest weist die häufigsten und klinisch relevantesten Darmparasiten bei Hunden und Katzen nach, einschließlich *Cystoisospora*.⁷
- + Sie erkennen bis zu doppelt so viele Infektionen als mit der Flotation allein.⁸

Mehr Infektionen früher diagnostizieren

Ein früher Nachweis führt zu früherer Behandlung, was wiederum die Kontamination der Umgebung verringert.

Vermeidung falsch-negativer Befunde.


Sind in einem Tier nur Parasiten eines Geschlechts, so werden keine Eier produziert und die Flotation liefert ein falsch-negatives Ergebnis. Der Fecal Dx Antigentest deckt diese Infektionen auf, da er bestimmte Proteine nachweist, die von männlichen und weiblichen Parasiten abgegeben werden.

Fecal Dx™ Antigentests sind die Zukunft von Parasiten, die keine Zukunft haben.

So ist es. Der Nachweis von Antigenen im Kot ist die Zukunft des Screenings auf Parasiten, da hiermit bis zu doppelt so viele Infektionen erkannt werden.* Eine retrospektive Studie mit fast 900.000 Fällen, in der Koproantigentests mit der Flotation verglichen wurden, ergab, dass die Flotation nur selten zusätzliche klinisch relevante Infektionen offenlegt.⁸


*Kumulative Antigenpositivität für 6 Antigene/beliebige Positivität in der Flotation = 1,9x mehr.
Kumulative Antigenpositivität für 6 Antigene/Positivität in der Flotation für dieselben Parasiten = 2,3x mehr.

Es scheint, dass die Flotation untergeht.



Erfahren Sie mehr über das Einbeziehen von Fecal Dx™ Antigentests in regelmäßige Kotuntersuchungen.

Mehr erfahren





Literaturnachweise

1. *ESCCAP Guideline 01 Seventh Edition – June 2025: Worm Control in Dogs and Cats.* European Scientific Counsel Companion Animal Parasites; 2025 Abgerufen am 16. Juli 2025. www.esccap.org/uploads/docs/vp2gim8y_0778_ESCCAP_GL1__English_2025_v20.pdf
2. *ESCCAP Guideline 04 First Edition – November 2022: Parasitological Diagnosis in Cats, Dogs and Equines.* European Scientific Counsel Companion Animal Parasites; 2022. Zugriff am 16. Juli 2025. www.esccap.org/uploads/docs/hgqo8xak_1335_ESCCAP_GL4_v2_1p.pdf
3. *ESCCAP Modular Guide Series 01 Third Edition: Worm Control in Dogs and Cats* [adapted from *ESCCAP Guideline 01 Sixth Edition – May 2021: Worm Control in Dogs and Cats*]. European Scientific Counsel Companion Animal Parasites; 2021. Zugriff am 16. Juli 2025. www.esccap.org/uploads/docs/uoayqf2a_0461_ESCCAP_MG1__English_20210518.pdf
4. Elsemore D, Bezold T, Geng J, Hanna R, Tyrrell P, Beall M. Immunoassay for detection of *Dipylidium caninum* coproantigen in dogs and cats. *J Vet Diagn Invest.* 2023;35(6): 671–678. doi:10.1177/10406387231189193
5. Elsemore DA, Geng J, Flynn L, Cruthers L, Lucio-Forster A, Bowman DD. Enzyme-linked immunosorbent assay for coproantigen detection of *Trichuris vulpis* in dogs. *J Vet Diagn Invest.* 2014;26(3):404–411.
6. Elsemore DA, Geng J, Cote J, Hanna R, Lucio-Forster A, Bowman DD. Enzyme-linked immunosorbent assays for coproantigen detection of *Ancylostoma caninum* and *Toxocara canis* in dogs and *Toxocara cati* in cats. *J Vet Diagn Invest.* 2017;29(5): 645–653. doi:10.1177/1040638717706098
7. Sweet S, Hegarty E, McCrann DJ, Coyne M, Kincaid D, Szlosek D. A 3-year retrospective analysis of canine intestinal parasites: fecal testing positivity by age, U.S. geographical region and reason for veterinary visit. *Parasit Vectors.* 2021;14(1):173. doi:10.1186/s13071-021-04678-6
8. Burton KW, Michael H, Drake C. The utility of coproantigen testing in screening populations. *Vet Parasitol.* 2025;336:110459. doi:10.1016/j.vetpar.2025.110459

IDEXX GmbH
Humboldtstr. 2
70806 Kornwestheim
idexx.de/fecaldx

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Börsegasse 12/1
1010 Wien
idexx.at/fecaldx

